



## Ivan M. Grunnet

Speciallæge i gynækologi

Skt. Anne Plads 2, 5000 Odense C. Tlf. 66 14 76 00. Ydernr. 244570

Email: [klinikken@ivangrunnet.dk](mailto:klinikken@ivangrunnet.dk)

[www.ivangrunnet.dk](http://www.ivangrunnet.dk)

## Keglesnitsoperation

### Forberedelse

Indgrebet foretages i lokalbedøvelse.

Man må meget gerne ledsages af en pårørende, ven eller kæreste.

### Indgrebet

Operationen varer ca. 5 min. og forberedelserne ca. 10 min.

Der sprøjtes lokalbedøvelse omkring livmoderhalsen. Man vil dog hele tiden kunne mærke, at der bliver rørt ved én, men der burde ikke være smerter. Medens bedøvelsen virker, fjerner lægen det yderste af livmoderhalsen, svarende til hvor de forandrede celler er påvist.

Det fjernede vævskeglen bliver sendt til mikroskopisk undersøgelse på sygehuset.

**Indgrebet anbefales foretaget udenfor menstruationsperioden.**

### Efter indgrebet

Efter indgrebet kan der blive lagt en gazetampon op i skeden. I så fald skal denne blive liggende til næste dags morgen.

Man skal køres hjem og holde sig i ro de første 2 døgn dvs. ligge ned i seng eller sofa.

Der kan gå op til 5 uger før man modtager skriftlig besked per mail med svar på undersøgelsen af det fjernede væv, og plan/anbefaling for det videre forløb.

### Normale følger

**Smerter:** Det er almindeligt, at der kommer lette menstruationslignende smerter efter indgrebet.

Som regel aftager smerterne efter nogle timer. De må gerne tage smertestillende håndkøbsmedicin, f.eks. Panodil eller Iprex. Følg anvisningen på glasset.

**Blødning:** I den første tid efter indgrebet vil der være lidt blødning eller brunligt udflåd, men det aftager gradvist i løbet af 2-3 uger. For at undgå infektion skal De bruge bind **ikke** tamponer, og De skal undgå samleje, karbad, svømmehal og havbad til blødningen er ophørt.

### Sygemelding

Der tilrådes sygemelding i 3 dage efter operationen, og undgåelse af sport og tunge løft i 1 uge.

### Komplikationer

Indenfor de første par uger kan der i sjældne tilfælde opstå unormal, kraftig blødning eller underlivsbetændelse.

Indenfor klinikens åbningstid er man velkommen til at ringe op, og aftale en akut kontroltid her på stedet.

Udenfor klinikens åbningstid skal man derimod kontakte vagtlægen, og fortælle, at man har fået foretaget en keglesnitsoperation i lokalbedøvelse.

### Fremtiden

**Graviditet:** Keglesnitsoperation har normalt ingen betydning for muligheden for at gennemføre en normal graviditet.

**Seksualliv:** Keglesnit i livmoderhalsen har ingen indflydelse på seksuallivet.

Er der yderligere spørgsmål, er man altid velkommen til at kontakte klinikken.

Med venlig hilsen

Ivan Moulun Grunnet

Speciallæge i gynækologi

Lavet d. 1.7.19 IG

Revideres juli 2022